

# 数值分析作业解答

## 原生生物

\* 对应徐岩老师《数值分析》课程作业，教材为 Kincaid、Cheney 《数值分析》，包含期中小测。

## 目录

1 第一次作业	2
2 第二次作业	2
3 第三次作业	4
4 第四次作业	4
5 第五次作业	6
6 第六次作业	8
7 第七次作业	10
8 第八次作业	10
9 期中小测	13

## 1 第一次作业

### 1. (习题 6.1.2)

由 Lagrange 型插值多项式的定义, 必然存在  $y_i, i = 0, \dots, n$  使得  $Lf = \sum_{i=0}^n y_i l_i$ , 而由于  $(Lf)(x_t) = f(x_t)$ , 由  $l_i$  定义可知  $f(x_t) = \sum_{i=0}^n y_i \delta_i^t = y_t$ , 从而得证一切  $y_i = f(x_i)$ 。

由此,  $L(af + bg) = \sum_{i=0}^n (af + bg)(x_i)l_i = \sum_{i=0}^n (af(x_i) + bg(x_i))l_i = aLf + bLg$ , 即得证。

### 2. (习题 6.1.3)

由于  $l_i$  次数为  $n$ ,  $l_i^2$  次数为  $2n$ , 因此  $Gf$  次数至多为  $2n$ 。

由  $Gf(x_t) = \sum_{i=0}^n f(x_i)(\delta_i^t)^2 = f(x_t)$  可知  $Gf$  为给定结点的插值多项式。

当  $f$  非负时, 每个  $f(x_i)l_i^2$  非负, 因此  $Gf$  非负。

### 3. (习题 6.1.4)

由习题 6.1.2 的推导可知  $x_0$  到  $x_n$  上均有  $Lq(x_i) = q(x_i)$ , 于是  $Lq - q$  至少有  $n+1$  个不同零点, 但其次数不超过  $n$ , 于是必须为 0, 也即  $Lq = q$ 。

### 4. (习题 6.1.5)

由习题 6.1.4, 令  $q(x) = 1$ , 代入即得  $\sum_{i=0}^n l_i(x) = 1$ 。

### 5. (习题 6.1.6)

$f - p = f - Lf = f - \sum_{i=0}^n f(x_i)l_i$ , 由习题 6.1.5,  $f = f \sum_{i=0}^n l_i$ , 于是  $f - p = \sum_{i=0}^n (f - f(x_i))l_i$ , 代入  $x$  即得结论。

### 6. (习题 6.1.7)

内循环中每次进行两次乘法, 而外循环中还有一次除法, 因此总次数为  $\sum_{k=1}^n (2(k-1) + 1) = n^2$ 。

### 7. (习题 6.1.8)

设  $p(x) = ax^2 + bx + c$  可得方程  $\begin{cases} c = p(0) \\ a + b + c = p(1) \\ 2\xi a + b = p'(\xi) \end{cases}$ 。当  $\xi \neq \frac{1}{2}$  时, 有解  $\begin{cases} a = \frac{p'(\xi) + p(0) - p(1)}{2\xi - 1} \\ b = \frac{-p'(\xi) - 2\xi p(0) + 2\xi p(1)}{2\xi - 1} \\ c = p(0) \end{cases}$ ,

否则当  $p'(\frac{1}{2}) = p(1) - p(0)$  时有无穷多解  $\begin{cases} a = t \\ b = p(1) - p(0) - t \\ c = p(0) \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ , 其余情况无解。

## 2 第二次作业

### 1. (习题 6.1.14)

由其为奇函数,  $x = 0$  时由取 0 为插值点显然满足, 只需证明  $x > 0$  的情况,  $x < 0$  时由对称性成立。

由 6.1 节定理 4, 存在  $\xi$  使得  $p(x) - f(x) = \frac{\prod_{i=1}^{n-1}(x-x_i)}{n!} f^{(n)}(\xi)x$ , 由于  $|x - x_i| \leq 2$ ,  $f^{(n)}(\xi)$  为  $\sinh(\xi)$  或  $\cosh(\xi)$ , 估算知在范围内模长  $\leq 2$ , 在  $x > 0$  时有  $|p(x) - f(x)| \leq \frac{2^n}{n!}x$ 。由于  $x > 0$  时  $(\sinh x - x)' = \frac{e^x + e^{-x} - 2}{2} \geq 0$ , 且  $\sinh 0 = 0$ , 恒有  $\sinh x > x$  成立, 即得  $|p(x) - f(x)| \leq \frac{2^n}{n!}f(x)$ , 得证。

## 2. (习题 6.1.27)

由于  $e^{x-1}$  各阶导数为自己,  $\max_{|t| \leq 1} |f^{(13)}(t)| \leq 1$ , 于是在 Chebyshev 点下误差  $|p(x) - f(x)| \leq \frac{1}{2^{12}13!} = \frac{1}{25505877196800}$ 。

## 3. (习题 6.2.3)

在  $x_1, \dots, x_n$  以任何子列 (记为  $x_i^{(k)}$ ) 趋向  $x_0$  时,  $m_k = \max_i |x_i^{(k)} - x_0|$  必然趋于 0, 而利用 6.2 节定理 4, 必然存在  $\xi_k \in [x_0 - m_k, x_0 + m_k]$  满足  $f[x_0, x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}] = \frac{f^{(n)}(\xi_k)}{n!}$ , 由  $\xi_k \rightarrow x_0$  与  $f$  的  $n$  阶导函数连续知结论。

## 4. (习题 6.2.19)

记要证的函数为  $p$ , 直接计算得结论:

$$\begin{aligned} p(x_0) &= \frac{x_n - x_0}{x_n - x_0} u(x_0) = f(x_0), \quad p(x_n) = \frac{x_n - x_0}{x_n - x_0} v(x_n) = f(x_n) \\ p(x_i) &= \frac{(x_n - x_i)u(x_i) + (x_i - x_0)v(x_i)}{x_n - x_0} = \frac{x_n - x_i + x_i - x_0}{x_n - x_0} f(x_i) = f(x_i) \end{aligned}$$

## 5. (习题 6.2.23)

设  $q(x) = p(x) + tx(x+1)(x-1)(x-2)$ , 则仍然满足在前四点上是插值多项式, 且  $10 = q(3) = p(3) + 24t = -38 + 24t$ , 于是  $t = 2$ , 即

$$q(x) = 2 - (x+1) + x(x+1) - 2x(x+1)(x-1) + 2x(x+1)(x-1)(x-2)$$

## 6. (习题 6.3.1)

完整的均差表如下:

0	2	-9	3	7	5
0	2	-6	10	17	
1	-4	4	44		
1	-4	48			
2	44				

因此所求多项式为  $p(x) = 2 - 9x + 3x^2 + 7x^2(x-1) + 5x^2(x-1)^2$ 。

## 7. (习题 6.3.2)

$p(x)$  如习题 6.3.1, 记此题所求为  $q$ , 设  $q(x) = p(x) + tx^2(x-1)^2(x-2)$ , 代入  $x = 3$  可得  $2 = 308 + 36t$ , 于是  $t = -8.5$ , 即得

$$q(x) = 2 - 9x + 3x^2 + 7x^2(x-1) + 5x^2(x-1)^2 - 8.5x^2(x-1)^2(x-2)$$

## 8. (习题 6.3.3)

同 Lagrange 插值记

$$l_i = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

考虑 ( $t_i$  为待定系数, 下记  $g_i = l_i^2(t_i(x-x_i)+1)$ )

$$p(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i^2 (t_i(x-x_i)+1)$$

直接计算可验证此时  $p(x_t) = y_t$ , 而由于  $l_i^2$  中包含所有  $j \neq i$  的  $(x - x_j)^2$ , 必有  $g'_i(x_j) = 0, j \neq i$ , 于是只需保证  $g'_i(x_i) = 0$ 。

注意到  $g'_i(x_i) = 2l_i(x_i)l'_i(x_i) + l_i^2(x_i)t_i$ , 利用  $l_i(x_i) = 1$  可得  $t_i = -2l'_i(x_i)$ , 进一步计算可知  $l'_i(x_i) = \sum_{j \neq i} \frac{1}{x_i - x_j}$ , 于是  $t_i = -\sum_{j \neq i} \frac{2}{x_i - x_j}$ 。

综上得

$$p(x) = \sum_{i=0}^n y_i \left( 1 - \sum_{j \neq i} \frac{2}{x_i - x_j} (x - x_i) \right) \prod_{j \neq i} \frac{(x - x_j)^2}{(x_i - x_j)^2}$$

另一方面, 其次数至多为  $2n + 1$ , 根据 6.3 节定理 1, 这是  $2n + 1$  次及以下唯一满足要求的多项式, 于是次数最小。

### 3 第三次作业

#### 1. (习题 6.4.7)

记三段为  $S_{1,2,3}$ , 由  $S_1(1) = S_2(1), S_1(3) = S_2(3)$  可知  $a = c = d$ , 而此时可以验证  $x = 1, 3$  处一、二阶导数均光滑, 因此已经为三次样条。

代入三个点得  $\begin{cases} 4a - b = 26 \\ c = 7 \\ 4d + e = 25 \end{cases}$ , 解得  $\begin{cases} a = c = d = 7 \\ b = 2 \\ e = -3 \end{cases}$ 。

#### 2. (习题 6.4.11)

由于  $d(x-1)^3$  在 1 处的低于 3 阶导数均为 0, 必然有  $a + b(x-1) + c(x-1)^2 = 3 + x - 9x^2$ , 直接

展开对比得到  $\begin{cases} a = -5 \\ b = -17 \\ c = -9 \end{cases}$ 。

由于 0 到 1 已确定, 只需要保证  $\int_0^1 [f''(x)]^2 dx = \int_0^1 (-18 + 6dx)^2 dx$  最小, 直接对  $d$  求导 (这里积分求导可交换) 可得  $\int_0^1 12x(-18 + 6dx) dx = 0$ , 解得  $d = 4.5$ 。

$f''(2) = 0$  也即  $-18 + 6d = 0$ , 于是  $d = 3$ , 不同于前面所确定的值是由于  $f''(0) \neq 0$ , 不符合自然样条的另一端点要求。

#### 3. (习题 6.4.12)

不是三次样条,  $\lim_{x \uparrow 0} f'(x) = 1 \neq -1 = \lim_{x \downarrow 0} f'(x)$ , 而  $\lim_{x \uparrow 0} f''(x) = 0 = \lim_{x \downarrow 0} f''(x)$ 。

#### 4. (习题 6.4.14)

由形式可看出  $f''(-1) = 0$ , 且由于  $2(x+1) + (x+1)^3 = x^3 + 3x^2 + 5x + 3$ , 其 0 处低于 3 阶导数与  $3x^2 + 5x + 3$  相同。同理,  $3x^2 + 5x + 3 = 3(x-1)^2 + 11(x-1) + 11$ , 其 1 处低于 3 阶导数与  $3(x-1)^2 + 11(x-1) + 11 - (x-1)^3$  相同。最后,  $f''(2) = 6 - 6 * (2-1) = 0$ , 于是这是一个自然三次样条。

#### 5. (习题 6.4.26)

由于  $x^3 = (x-1)^3 + 3(x-1)^2 + 3(x-1) + 1$ , 由 1 处 0 到 2 阶导数相同可知  $a = b = 3, c = 1$ 。由于  $f''(3) = 3 * (3-1) + 2 * 3 = 12 \neq 0$ , 不是自然三次样条。

### 4 第四次作业

#### 1. (习题 6.8.8)

归纳, 由条件知  $p_0$  偶函数, 下面假设  $p_{n-1}$  与 ( $n > 1$  时)  $p_{n-2}$  满足要求:

$a_n = \langle p_{n-1}, p_{n-1} \rangle^{-1} \int_{-a}^a xp_{n-1}^2(x)w(x)dx$ , 由于无论  $p_{n-1}$  奇偶,  $p_{n-1}^2$  为偶函数, 因此积分中为奇函数, 利用对称性可知  $a_n = 0$ , 于是  $p_n(x) = xp_{n-1}(x) - b_n p_{n-2}(x)$ 。

当  $n$  为偶数时,  $p_{n-1}$  为奇函数,  $xp_{n-1}(x)$  为偶函数, 且  $p_{n-2}$  为偶函数, 于是  $p_n$  为偶函数;

当  $n$  为奇数时,  $p_{n-1}$  为偶函数,  $xp_{n-1}(x)$  为奇函数, 且  $p_{n-2}$  为奇函数, 于是  $p_n$  为奇函数。

### 2. (习题 6.8.18)

- (1)  $P_n(af + bg) = \sum_{i=1}^n \langle af + bg, u_i \rangle u_i = a \sum_{i=1}^n \langle f, u_i \rangle u_i + b \sum_{i=1}^n \langle g, u_i \rangle u_i = aP_n f + bP_n g$ , 由此线性。此外, 由形式即得  $P_n f$  被  $u_1, \dots, u_n$  生成, 于是成立。
- (2) 由  $j \leq n$  时  $\langle \sum_{i=1}^n \langle f, u_i \rangle u_i, u_j \rangle = \sum_{i=1}^n \langle f, u_i \rangle \langle u_i, u_j \rangle = \langle f, u_j \rangle$  有  $P_n(P_n f) = \sum_{j=1}^n \langle f, u_j \rangle u_j = P_n f$ , 于是  $P_n^2 = P_n$ 。
- (3) 由 (2),  $\langle P_n f, u_j \rangle = \langle f, u_j \rangle$  对  $j \leq n$  成立, 于是  $\langle f - P_n f, u_j \rangle = \langle f, u_j \rangle - \langle f, u_j \rangle = 0$ , 也即  $f - P_n f \perp \text{Span}(u_1, \dots, u_n) = U_n$ 。
- (4) 设  $U_n$  中某逼近为  $u + P_n f$ , 由 (3) 有  $\langle f - P_n f, u \rangle = 0$ , 则  $\|f - u - P_n f\|^2 = \|f - P_n f\|^2 + \|u\|^2 \geq \|f - P_n f\|^2$ , 从而得证。
- (5) 由 (1)(3),  $\langle P_n f, g - P_n g \rangle = 0$ , 因此  $\langle P_n f, g \rangle = \langle P_n f, g \rangle - \langle P_n f, g - P_n g \rangle = \langle P_n f, P_n g \rangle$ , 同理  $\langle P_n f, P_n g \rangle = \langle f, P_n g \rangle$ , 从而得证。

### 3. (习题 6.8.21)

接书例 2 推导, 由习题 6.8.8, 所有  $a_n$  必须为 0, 计算可得:

$$\begin{aligned} b_3 &= \frac{4}{15} \Rightarrow p_3(x) = x^3 - \frac{3}{5}x \\ b_4 &= \frac{9}{35} \Rightarrow p_4(x) = x^4 - \frac{6}{7}x^2 + \frac{3}{35} \\ b_5 &= \frac{16}{63} \Rightarrow p_5(x) = x^5 - \frac{10}{9}x^3 + \frac{5}{21}x \end{aligned}$$

### 4. (习题 6.9.2)

假设为  $g(x) = ax + b$ , 有方程组:

$$\begin{cases} b = \delta \\ a + b - 1 = \delta \\ \sqrt{t} - at - b = \delta \\ a - \frac{1}{2\sqrt{t}} = 0 \end{cases}$$

解得  $\delta = \frac{1}{8}$ ,  $t = \frac{1}{4}$ ,  $g(x) = x + \frac{1}{8}$ 。

### 5. (习题 6.9.5)

$$\|f - a\| \geq \max(|M(f) - a|, |a - m(f)|) \geq \frac{|M(f) - a| + |a - m(f)|}{2} \geq \frac{M(f) - m(f)}{2}$$

且当  $a = \frac{M(f)+m(f)}{2}$  时等号成立, 因此最佳逼近是  $\frac{M(f)+m(f)}{2}$ 。

### 6. (习题 6.9.16)

记要证为最佳逼近的多项式为  $g(x)$ , 当  $a_{n+1} = 0$  时,  $g = f$ , 于是为最佳逼近, 否则, 同乘比例不影响结果, 可不妨设  $a_{n+1} = 1$ , 利用本节推论 6, 即证明存在  $[-1, 1]$  中的点  $x_0 < \dots < x_{n+1}$  使得

$$T_{n+1}(x_i) = (-1)^i c \|T_{n+1}\|, i \in [0, n+1], |c| = 1$$

由在  $[-1, 1]$  上  $T_{n+1}(x) = \cos((n+1)\arccos x)$ ,  $\|T_{n+1}\| = 1$ , 令  $x_i = \cos \frac{\pi(n+1-i)}{n+1}$ , 则  $T_{n+1}(x_i) = \cos(n+1-i)\pi$ , 符合要求。

## 7. (习题 6.12.6)

第一条:  $\langle f, f \rangle_N = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} |f(2\pi j/N)|^2 \geq 0$ 。

第二条:  $\langle f, g \rangle_N = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} f(2\pi j/N) \overline{g(2\pi j/N)} = \overline{\frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} f(2\pi j/N) g(2\pi j/N)} = \overline{\langle g, f \rangle_N}$ 。

第三条: 将每一项左侧的  $f$  直接展开即得。

不是范数: 取  $f(x) = \sin(Nx)$ , 则  $\|f\|_N = 0$ , 但  $f \neq 0$ 。

## 8. (习题 6.13.6)

根据 6.12 节定理 2, 可知  $\langle f, E_j \rangle_{2n} = \gamma_j$ ,  $\langle f, E_{n+j} \rangle_{2n} = \gamma_{n+j}$ , 而  $u_j = \sum_{k=0}^{2n-1} \gamma_k \langle E_k, E_j \rangle_n = \gamma_j + \gamma_{n+j}$ ,

由此, 只需证明  $v_j = \gamma_j - \gamma_{n+j}$ 。

注意到  $T_{n/\pi} f = \sum_{k=0}^{2n-1} e^{ik\pi/n} \gamma_k E_i$ , 于是

$$v_j = e^{-ij\pi/n} (e^{ij\pi/n} \gamma_j + e^{i(j+n)\pi/n} \gamma_{n-j}) = \gamma_j + e^{i\pi} \gamma_{n+j} = \gamma_j - \gamma_{n+j}$$

得证。

## 5 第五次作业

## 1. (习题 7.1.4)

(a)

$$f'(x_0) = f'(\xi_{x_0})$$

(b)

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1} + \frac{f(x_1)}{x_1 - x_0} + \frac{1}{2} f''(x_0)(x_0 - x_1) \\ f'(x_1) &= \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1} + \frac{f(x_1)}{x_1 - x_0} + \frac{1}{2} f''(x_1)(x_1 - x_0) \end{aligned}$$

(c) (题目有误, 应为  $n = 2$ )

$f'(x_0), f'(x_2)$  分别为:

$$\begin{aligned} &\frac{(2x_0 - x_1 - x_2)f(x_0)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + \frac{(x_0 - x_1)f(x_1)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + \frac{(x_0 - x_2)f(x_2)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} + \frac{1}{6} f'''(\xi_{x_0})(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \\ &\frac{(x_2 - x_0)f(x_0)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + \frac{(x_2 - x_1)f(x_1)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + \frac{(2x_2 - x_0 - x_1)f(x_2)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} + \frac{1}{6} f'''(\xi_{x_2})(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) \end{aligned}$$

## 2. (习题 7.1.6)

(a)

$$\begin{aligned} f(x+2h) &= f(x) + 2hf'(x) + 2h^2 f''(x) + \frac{4}{3} h^3 f'''(x) + \frac{2}{3} h^4 f^{(4)}(x) + \frac{4}{15} h^5 f^{(5)}(\xi_1) \\ f(x+h) &= f(x) + hf'(x) + \frac{1}{2} h^2 f''(x) + \frac{1}{6} h^3 f'''(x) + \frac{1}{24} h^4 f^{(4)}(x) + \frac{1}{120} h^5 f^{(5)}(\xi_2) \\ f(x-h) &= f(x) - hf'(x) + \frac{1}{2} h^2 f''(x) - \frac{1}{6} h^3 f'''(x) + \frac{1}{24} h^4 f^{(4)}(x) - \frac{1}{120} h^5 f^{(5)}(\xi_3) \\ f(x-2h) &= f(x) - 2hf'(x) + 2h^2 f''(x) - \frac{4}{3} h^3 f'''(x) + \frac{2}{3} h^4 f^{(4)}(x) - \frac{4}{15} h^5 f^{(5)}(\xi_4) \end{aligned}$$

代入可得

$$LHS - RHS = \frac{h^4}{45} f^{(5)}(\xi_1) - \frac{h^4}{180} f^{(5)}(\xi_2) - \frac{h^4}{180} f^{(5)}(\xi_3) + \frac{h^4}{45} f^{(5)}(\xi_4) = O(h^4)$$

(b)

$$\begin{aligned}
f(x+2h) &= f(x) + 2hf'(x) + 2h^2f''(x) + \frac{4}{3}h^3f'''(x) + \frac{2}{3}h^4f^{(4)}(x) + \frac{4}{15}h^5f^{(5)}(x) + \frac{4}{45}h^6f^{(6)}(\xi_1) \\
f(x+h) &= f(x) + hf'(x) + \frac{1}{2}h^2f''(x) + \frac{1}{6}h^3f'''(x) + \frac{1}{24}h^4f^{(4)}(x) + \frac{1}{120}h^5f^{(5)}(x) + \frac{1}{720}h^6f^{(6)}(\xi_2) \\
f(x-h) &= f(x) - hf'(x) + \frac{1}{2}h^2f''(x) - \frac{1}{6}h^3f'''(x) + \frac{1}{24}h^4f^{(4)}(x) - \frac{1}{120}h^5f^{(5)}(x) + \frac{1}{720}h^6f^{(6)}(\xi_3) \\
f(x-2h) &= f(x) - 2hf'(x) + 2h^2f''(x) - \frac{4}{3}h^3f'''(x) + \frac{2}{3}h^4f^{(4)}(x) - \frac{4}{15}h^5f^{(5)}(x) + \frac{4}{45}h^6f^{(6)}(\xi_4)
\end{aligned}$$

代入可得

$$LHS - RHS = \frac{h^4}{135}f^{(6)}(\xi_1) - \frac{h^4}{960}f^{(6)}(\xi_2) - \frac{h^4}{960}f^{(6)}(\xi_3) + \frac{h^4}{135}f^{(6)}(\xi_4) = O(h^4)$$

3. (习题 7.1.7)

(a)

$$\begin{aligned}
f(x+3h) &= f(x) + 3hf'(x) + \frac{9}{2}h^2f''(x) + \frac{9}{2}h^3f'''(x) + \frac{27}{8}h^4f^{(4)}(\xi_1) \\
f(x+2h) &= f(x) + 2hf'(x) + 2h^2f''(x) + \frac{4}{3}h^3f'''(x) + \frac{2}{3}h^4f^{(4)}(\xi_2) \\
f(x+h) &= f(x) + hf'(x) + \frac{1}{2}h^2f''(x) + \frac{1}{6}h^3f'''(x) + \frac{1}{24}h^4f^{(4)}(\xi_3)
\end{aligned}$$

代入可得

$$LHS - RHS = -\frac{27h}{8}f^{(4)}(\xi_1) + 2hf^{(4)}(\xi_2) - \frac{h}{8}f^{(4)}(\xi_3) = O(h)$$

(b) 利用习题 7.1.6(a) 代入可得

$$LHS - RHS = -\frac{2h^2}{15}f^{(5)}(\xi_1) + \frac{h^2}{120}f^{(5)}(\xi_2) + \frac{h^2}{120}f^{(5)}(\xi_3) - \frac{2h^2}{15}f^{(5)}(\xi_4) = O(h^2)$$

比 (a) 更精确。

4. (习题 7.1.15)

由式 (17) 可得  $L = \frac{4}{3}\varphi\left(\frac{h}{2}\right) - \frac{1}{3}\varphi(h)$ , 而

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \varphi(h) - \frac{h^2}{6}f'''(x) - \frac{h^4}{120}f^{(5)}(\xi_1) \\
f'(x) &= \varphi\left(\frac{h}{2}\right) - \frac{h^2}{24}f'''(x) - \frac{h^4}{1920}f^{(5)}(\xi_2)
\end{aligned}$$

于是误差项为:

$$f'(x) - L = \frac{h^4}{360}f^{(5)}(\xi_1) - \frac{h^4}{1440}f^{(5)}(\xi_2)$$

5. (习题 7.1.17)

利用习题 7.1.7(a) 也即

$$\begin{cases} A + B + C + D = 0 \\ 3A + 2B + C = 0 \\ \frac{9}{2}A + 2B + \frac{1}{2}C = 1 \\ \frac{9}{2}A + \frac{4}{3}B + \frac{1}{6}C = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} A = -1 \\ B = 4 \\ C = -5 \\ D = 2 \end{cases}, \text{ 误差为 } O(h^2)。$$

6. (习题 7.2.1)

设公式为  $Af(0) + Bf(\frac{1}{3}) + Cf(\frac{2}{3}) + Df(1)$ , 代入  $1, x, x^2, x^3$  即得

$$\begin{cases} A + B + C + D = 1 \\ \frac{1}{3}B + \frac{2}{3}C + D = \frac{1}{2} \\ \frac{1}{9}B + \frac{4}{9}C + D = \frac{1}{3} \\ \frac{1}{27}B + \frac{8}{27}C + D = \frac{1}{4} \end{cases}, \text{解得}$$

$$\int_0^1 f(x)dx \approx \frac{1}{8} \left( f(0) + 3f\left(\frac{1}{3}\right) + 3f\left(\frac{2}{3}\right) + f(1) \right)$$

7. (习题 7.2.4)

令  $f\left(\frac{i}{4}\right)$  前的系数为  $a_i$ , 也即验证  $\sum_i a_i i^j = \frac{4^i}{j+1}$  对  $j = 0, 1, 2, 3, 4$  成立, 其中规定  $0^0 = 1$ , 代入即得结果。

8. (习题 7.2.9)

由题意可知  $2\pi a = A_1(a+b) + A_2(a-b)$ , 于是  $A_1 = A_2 = \pi$ 。

由于

$$\int_0^{2\pi} \sin kx = 0 = \pi \sin k\pi + \pi \sin 0$$

$$\int_0^{2\pi} \cos(2k+1)x = 0 = -\pi + \pi = \pi \cos(2k+1)\pi + \pi \cos 0$$

于是对  $f(x) = \sum_{k=0}^n (a_k \cos(2k+1)x + b_k \sin kx)$  亦精确成立。

## 6 第六次作业

1. 推导 Gauss-Lobatto 积分公式, 并证明系数  $A_i, i = 0, \dots, n$  是正的。

考虑区间端点  $a, b$  时, 任何不超过  $2n-1$  次的多项式  $p(x)$  都可以写成  $(x-a)(x-b)q(x) + r(x-a) + s(b-x)$ , 其中  $q(x)$  是不超过  $2n-3$  次的多项式。

直接代入可解出  $r = \frac{p(b)}{b-a}, s = \frac{p(a)}{b-a}$ , 而另一方面, 由积分相同, 假设  $x_i^*$  与  $A_i^*, i = 1, \dots, n-1$  满足以新权函数  $(x-a)(b-x)w(x)$  构造的, 对不超过  $2n-3$  次的多项式严格成立的高斯公式, 可以直接比对系数计算出

$$\int_a^b p(x)w(x)dx = \sum_{i=1}^{n-1} A_i^* \frac{p(x_i^*) - r(x_i^* - a) - s(b - x_i^*)}{(x_i^* - a)(b - x_i^*)} + r \int_a^b (x-a)w(x)dx + s \int_a^b (b-a)w(x)dx$$

进一步整理即得最终的结点与系数为:

$$x_i = \begin{cases} a & i = 0 \\ x_i^* & 0 < i < n \\ b & i = n \end{cases}, A_i = \begin{cases} \frac{1}{b-a} \left( \int_a^b (b-x)w(x)dx - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{A_i^*}{x_i^*-a} \right) & i = 0 \\ \frac{A_i^*}{(x_i^*-a)(b-x_i^*)} & 0 < i < n \\ \frac{1}{b-a} \left( \int_a^b (x-a)w(x)dx - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{A_i^*}{b-x_i^*} \right) & i = n \end{cases}$$

为证明  $A_i > 0$ , 考虑多项式  $p_i(x) = \begin{cases} (b-x) \prod_{j=1}^{n-1} (x-x_j)^2 & i = 0 \\ (x-a)(b-x) \prod_{0 < j \neq i < n} (x-x_j)^2 & 0 < i < n \\ (x-a) \prod_{j=1}^{n-1} (x-x_j)^2 & i = n \end{cases}$ , 注意到  $p_i(x)$  恒非负连续, 次数不超过  $2n-1$ , 且非零点的结点有且仅有  $x_i$ , 代入即得证  $A_i > 0$ 。

## 2. (习题 7.3.8)

利用 6.8 节定理 5 构造正交多项式 (由习题 6.8.8 只需计算  $b_n$ ):

$$p_0(x) = 1, p_1(x) = x, p_2(x) = x^2 - \frac{3}{5}, p_3(x) = x^3 - \frac{5}{7}x$$

利用定理 1 即可得到  $x_i$ , 进一步计算  $A_i$ :

a.

$$x_0 = -\sqrt{\frac{3}{5}}, x_1 = \sqrt{\frac{3}{5}}, A_0 = A_1 = \frac{1}{3}$$

b.

$$x_0 = -\sqrt{\frac{5}{7}}, x_1 = 0, x_2 = \sqrt{\frac{5}{7}}, A_0 = A_2 = \frac{7}{25}, A_1 = \frac{8}{75}$$

## 3. (习题 7.3.21)

a. 分别取  $f(x) = 1, x, x^2$  得  $\begin{cases} A + B + C = 2 \\ A = C \\ \frac{3}{5}(A + C) = \frac{2}{3} \end{cases}$ , 解得  $\begin{cases} A = C = \frac{5}{9} \\ B = \frac{8}{9} \end{cases}$ 。

b.

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^1 \frac{(x-0)(x-\sqrt{3/5})}{6/5} = \frac{5}{9} \\ B &= \int_{-1}^1 \frac{(x+\sqrt{3/5})(x-\sqrt{3/5})}{-3/5} = \frac{8}{9} \\ C &= \int_{-1}^1 \frac{(x+\sqrt{3/5})(x-0)}{6/5} = \frac{5}{9} \end{aligned}$$

## 4. (习题 7.3.22)

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2}x + \frac{a+b}{2}\right) dx \\ &\approx \frac{b-a}{2} \left( \frac{5}{9}f\left(-\frac{b-a}{2}\sqrt{\frac{3}{5}} + \frac{a+b}{2}\right) + \frac{8}{9}f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{5}{9}f\left(\frac{b-a}{2}\sqrt{\frac{3}{5}} + \frac{a+b}{2}\right) \right) \end{aligned}$$

结果为:

$$(a) \frac{1}{4}\pi \left( \frac{5}{9} \left( \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{5}{3}} + \frac{\pi}{4} \right) + \frac{5}{9} \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{5}{3}} \right) + \frac{2\pi}{9} \right) = \frac{\pi^2}{8}$$

$$(b) 2 \left( \frac{4\sin 2}{9} + \frac{5\sin(2\sqrt{5/3}+2)}{9(2\sqrt{5/3}+2)} + \frac{5\sin(2-2\sqrt{5/3})}{9(2-2\sqrt{5/3})} \right) \approx 1.7580$$

## 5. (习题 7.4.6)

$$(a) R(0,0) = \frac{4}{3}, R(1,0) = \frac{7}{6}, R(2,0) = \frac{67}{60}$$

$$R(1,1) = \frac{10}{9}, R(2,1) = \frac{11}{10}$$

$$R(2,2) = \frac{742}{675} \approx 1.099$$

$$(b) R(0,0) = \frac{\pi}{16}, R(1,0) = \frac{3\pi}{64}, R(2,0) = \frac{11\pi}{256}$$

$$R(1,1) = \frac{\pi}{24}, R(2,1) = \frac{\pi}{24}$$

$$R(2,2) = \frac{\pi}{24}$$

## 7 第七次作业

1. (习题 8.1.5)

- a.  $t_x = x^2, t(0) = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{3}x^3 \Rightarrow x = \sqrt[3]{3t}, t \in \mathbb{R}$
- b.  $t_x = \frac{1}{1+x^2}, t(0) = 0 \Rightarrow t = \arctan x \Rightarrow x = \tan t, t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$
- c.  $t_x = \sin x + \cos x, t(0) = 0 \Rightarrow t = \sin x - \cos x + 1 = \sqrt{2} \sin(x - \frac{\pi}{4}) + 1 \Rightarrow x = \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}(t - 1) + \frac{\pi}{4}, t \in (-\sqrt{2} + 1, \sqrt{2} + 1)$

2. (习题 8.1.12)

当  $|t| \leq \frac{1}{3}, |x| \leq 1$  时,  $|f(x, t)| \leq 1 + |x| + |x|^2 \leq 3$ , 于是利用定理 1 即得在  $|t| \leq \min(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = \frac{1}{3}$  内解存在。

3. (习题 8.2.2)

直接计算验证可知  $x = \frac{t^2}{4}$  是解。

利用一阶泰勒级数方法, 即  $x(t+h) = x(t) + hx'(t)$ , 而由于 0 点处  $x=0, x'=\sqrt{x}=0$ , 无论如何递推都只能得到 0。这是由于事实上需要二阶展开才能得到  $x$  的精确表示, 二阶展开得到的  $x'' = \frac{1}{2\sqrt{x}}x' = \frac{1}{2}$ (若不代入表达式会产生 0/0 极限) 是准确的。此外, 解并不唯一,  $x=0$  也是方程的解。

4. (习题 8.2.4)

$$x(0) = 1$$

$$x' = x^2 + xe^t \Rightarrow x'(0) = 2$$

$$x'' = (2x + e^t)x' + xe^t \Rightarrow x''(0) = 7$$

$$x''' = (2x + e^t)x'' + (2x' + 2e^t)x' + xe^t \Rightarrow x'''(0) = 34$$

$$x(0.01) \approx x(0) + \frac{1}{100}x'(0) + \frac{1}{20000}x''(0) + \frac{1}{6000000}x'''(0) \approx 1.020356$$

## 8 第八次作业

1. (习题 8.3.5)

精确到三阶下

$$x(t+h) = x(t) + hf + \frac{1}{2}h^2(f_t + f_x f) + \frac{1}{6}h^3((f_t + f_x f)f_x + f_{tt} + 2ff_{xt} + f_{xx}f^2) + O(h^4)$$

而

$$f(t + \delta_t, x + \delta_x) = f(t, x) + \delta_t f_t + \delta_x f_x + \frac{1}{2}\delta_t^2 f_{tt} + \frac{1}{2}\delta_x^2 f_{xx} + \delta_x \delta_t f_{xt} + O(|\delta|^3)$$

于是有

$$\begin{cases} F_1 = hf \\ F_2 = hf + \frac{1}{2}h^2(f_t + f_x f) + \frac{1}{8}h^3(f_{tt} + 2ff_{xt} + f_{xx}f^2) \end{cases}$$

于是

$$\frac{9}{4} \left( x(t+h) - x(t) - \frac{2}{9}F_1 - \frac{1}{3}F_2 \right)$$

$$= hf + \frac{3}{4}h^2(f_t + f_x f) + \frac{9}{32}h^3(f_{tt} + 2ff_{xt} + f_{xx}f^2) + \frac{3}{8}h^3((f_t + f_x f)f_x) + O(h^4)$$

而由  $F_3$  前系数  $h$ ,  $F_2$  中三次项会成为四次, 因此舍去, 同理  $\delta_x^2$ 、 $\delta_x \delta_t$  中只保留  $\frac{9}{16}h^2 f^2$ 、 $\frac{9}{16}h^2 f$  一项, 得到

$$F_3 = hf + \frac{3}{4}h^2(f_t + f_x f) + \frac{3}{8}((f_t + f_x f)f_x) + \frac{9}{32}h^3(f_{tt} + 2ff_{xt} + f_{xx}f^2) + O(h^4)$$

与上方相同, 于是得证。

## 2. (习题 8.4.8)

由于结点距离未定, 以下不失一般性假设  $t_n = 0, h = 1$ 。

- a. 当  $f(t, x) = 1, x = t$  时有  $1 = A + B$ , 当  $f(t, x) = 2t, x = t^2$  时有  $1 = -2B$ , 联立得  $\begin{cases} A = \frac{3}{2} \\ B = -\frac{1}{2} \end{cases}$ , 即  $x_{n+1} = x_n + h\left(\frac{3}{2}f_n - \frac{1}{2}f_{n-1}\right)$ 。

- b. 由数值积分

$$\int_0^1 f(t, x(t))dt = Af(0, x(0)) + Bf(-1, x(-1))$$

分别代入  $f = 1, f = 2t$  得到  $\begin{cases} 1 = A + B \\ 1 = -2B \end{cases}$ , 联立得  $\begin{cases} A = \frac{3}{2} \\ B = -\frac{1}{2} \end{cases}$ 。

- c. 由定义若  $f(0, x(0)) = a, f(-1, x(-1)) = b$ , 则利用插值得到  $f(t, x(t)) = a + (a - b)t$ , 于是

$$x(1) = x(0) + \int_0^1 f(t, x(t))dt = x(0) + a + \frac{1}{2}(a - b) = x(0) + \frac{3}{2}a - \frac{1}{2}b$$

即  $A = \frac{3}{2}, B = \frac{1}{2}$ 。

## 3. (习题 8.4.9)

由于结点距离未定, 以下不失一般性假设  $t_n = 0, h = 1$ 。

- a. 当  $f(t, x) = 1, x = t$  时有  $1 = A + B$ , 当  $f(t, x) = 2t, x = t^2$  时有  $1 = 2A$ , 联立得  $\begin{cases} A = \frac{1}{2} \\ B = \frac{1}{2} \end{cases}$ , 即  $x_{n+1} = x_n + \frac{h}{2}(f_n + f_{n-1})$ 。

- b. 由数值积分

$$\int_0^1 f(t, x(t))dt = Af(1, x(1)) + Bf(0, x(0))$$

分别代入  $f = 1, f = 2t$  得到  $\begin{cases} 1 = A + B \\ 1 = 2A \end{cases}$ , 联立得  $\begin{cases} A = \frac{1}{2} \\ B = \frac{1}{2} \end{cases}$ 。

- c. 由定义若  $f(0, x(0)) = b, f(1, x(1)) = a$ , 则利用插值得到  $f(t, x(t)) = b + (a - b)t$ , 于是

$$x(1) = x(0) + \int_0^1 f(t, x(t))dt = x(0) + b + \frac{1}{2}(a - b) = x(0) + \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b$$

即  $A = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{2}$ 。

## 4. (习题 8.4.13)

由于结点距离未定, 不失一般性假设  $t_n = 0, h = 1$ 。由数值积分

$$\int_0^1 f(t, x(t))dt = Af(0, x(0)) + Bf(-2, x(-2)) + C(-4, x(-4))$$

分别代入  $f = 1, f = t, f = t^2$  得到

$$\begin{cases} 1 = A + B + C \\ \frac{1}{2} = -2B - 4C \\ \frac{1}{3} = 4B + 16C \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{17}{12} \\ B = -\frac{7}{12} \\ C = \frac{1}{6} \end{cases}$$

5. (习题 8.4.17)

也即  $k = 3, a_{3,2,1,0} = (1, 0, 0, -1), b_{3,2,1,0} = \frac{3}{8}(1, 3, 3, 1)$ 。

$$d_0 = \sum_i a_i = 0$$

$$d_1 = \sum_i i a_i - \sum_i b_i = 3 - 3 = 0$$

$$d_2 = \sum_i \frac{1}{2} i^2 a_i - \sum_i i b_i = \frac{9}{2} - \frac{9}{2} = 0$$

$$2d_3 = \sum_i \frac{1}{3} i^3 a_i - \sum_i i^2 b_i = 9 - 9 = 0$$

$$6d_4 = \sum_i \frac{1}{4} i^4 a_i - \sum_i i^3 b_i = \frac{81}{4} - \frac{81}{4} = 0$$

$$24d_5 = \sum_i \frac{1}{5} i^5 a_i - \sum_i i^4 b_i$$

由于  $\sum_i \frac{1}{5} i^5 a_i = \frac{243}{5}$ , 右侧分母不可能为 5,  $d_5 \neq 0$ , 阶为 4。

6. (习题 8.5.1)

a.  $p(z) = z^2 - 1, q(z) = 2z$ ,  $p$  根为  $\pm 1$ ,  $p'(1) = q(1) = 2$ , 稳定、相容。

b.  $p(z) = z^3 - z, q(z) = \frac{7}{3}z^2 - \frac{2}{3}z + \frac{1}{3}$ ,  $p$  根为  $0, \pm 1$ ,  $p'(1) = q(1) = 2$ , 稳定、相容。

c.  $p(z) = z^3 - z^2, q(z) = \frac{3}{8}z^3 + \frac{19}{24}z^2 - \frac{5}{24}z + \frac{1}{24}$ ,  $p$  根为  $0, 0, 1$ ,  $p'(1) = q(1) = 1$ , 稳定、相容。

7. (习题 8.5.4)

$p(z) = z^2 + 4z - 5, q(z) = 4z + 2$ ,  $p$  根为  $1, -5$ , 不稳定、弱不稳定, 于是不收敛;  $p'(1) = q(1) = 6$ , 相容。

8. (习题 8.5.6)

a.  $p(z) = z^2 - 1, q(z) = z^2 - 3z + 4$ ,  $p$  根为  $\pm 1$ ,  $p'(1) = q(1) = 2$ , 稳定、相容, 于是收敛。

b.  $p(z) = z^2 - 2z + 1$ , 在 1 重根, 不稳定, 于是不收敛。

c.  $p(z) = z^2 - z - 1$ ,  $p(1) \neq 0$ , 不相容, 于是不收敛。

d.  $p(z) = z^2 - 3z + 2$ , 有根为 2, 不稳定, 于是不收敛。

e.  $p(z) = z^2 - 1, q(z) = z^2 - 3z + 2$ ,  $p'(1) = 2, q(1) = 0$ , 不相容, 于是不收敛。

9. (习题 8.12.4)

$$p(z) = z^2 + \alpha z - (1 + \alpha), q(z) = -\frac{1}{2}\alpha z^2 + \frac{(4 + 3\alpha)}{2}z$$

稳定:  $p(z)$  根为  $1, -\alpha - 1$ , 稳定性要求  $-\alpha - 1 \in [-1, 1] \Rightarrow \alpha \in (-2, 0]$ 。

相容:  $p'(1) = 2 + \alpha = q(1)$ , 且  $p(1)$  为根, 一定相容。

收敛: 由 8.5 节定理 1 知稳定当且仅当  $\alpha \in (-2, 0]$ 。

A 稳定: 条件即对  $\operatorname{Re}(\omega) < 0$ ,  $p(z) - \omega q(z) = (1 + \frac{\alpha\omega}{2})z^2 + (\alpha - \frac{(4+3\alpha)\omega}{2})z - \alpha - 1$  的根在单位圆盘内。考虑极限可知需  $\omega = 0$ , 即  $p(z)$  的根满足  $|z| \leq 1$ , 因此至少有  $\alpha \in [-2, 0]$ 。这时, 由  $z^2$  前系数  $1 + \frac{\alpha\omega}{2}$  实部大于等于 1, 必然会有两个根, 解得它们为

$$\frac{-2\alpha + 4\omega + 3\alpha\omega \pm \sqrt{(1+\alpha)(4+2\alpha\omega) + (-2\alpha + 4\omega + 3\alpha\omega)^2}}{4+2\alpha\omega}$$

当  $|\omega| \rightarrow \infty$  时, 根即为  $q(z)$  的根  $0, \frac{4+3\alpha}{\alpha}$ , 分析可知预它们都在  $[-1, 1]$  范围内须  $\alpha \in [-2, -1]$ , 下证此即为最终结果。

二阶:

$$\begin{aligned} d_0 &= 1 + \alpha - 1 - \alpha = 0 \\ d_1 &= 2 + \alpha + \frac{1}{2}\alpha - \frac{4+3\alpha}{2} = 0 \\ d_2 &= 2 + \frac{1}{2}\alpha + \alpha - \frac{4+3\alpha}{2} = 0 \\ 2d_3 &= \frac{8}{3} + \frac{\alpha}{3} + 2\alpha - \frac{4+3\alpha}{2} = \frac{2}{3} + \frac{5}{6}\alpha \end{aligned}$$

其为 0 当且仅当  $\alpha = -\frac{4}{5}$ , 于是  $\alpha \neq -\frac{4}{5}$  时为二阶。

## 9 期中小测

1. (a) 均差表如下:

-1	2	-2	2	-5/6
0	0	2	-1/2	
1	2	1		
2	3			

(b) 由于是前三个点, 使用均差表除最后一斜行外的部分得到

$$p(x) = 2 - 2(x+1) + 2(x+1)x$$

2. 由条件设  $p_4^c(x) = p_4(x) + a(x+2)(x+1)(x-1)(x-2)$ , 代入  $p_4^c(0) = 3$  解得  $a = -\frac{1}{2}$ 。于是有

$$p_4^c(x) = 3 + 4x + \frac{11}{2}x^2 + 2x^3 + \frac{1}{2}x^4$$

3. 由条件需要对  $1, x, x^2, x^3, x^4$  都精确成立, 于是有

$$\begin{cases} A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 = 2 \\ -A_1 - \frac{1}{4}A_2 + \frac{1}{4}A_4 + A_5 = 0 \\ A_1 + \frac{1}{16}A_2 + \frac{1}{16}A_4 + A_5 = \frac{2}{3} \\ -A_1 - \frac{1}{64}A_2 + \frac{1}{64}A_4 + A_5 = 0 \\ A_1 + \frac{1}{256}A_2 + \frac{1}{256}A_4 + A_5 = \frac{2}{5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = \frac{43}{225} \\ A_2 = \frac{512}{225} \\ A_3 = -\frac{44}{15} \\ A_4 = \frac{512}{225} \\ A_5 = \frac{43}{225} \end{cases}$$

由于  $\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2}x + \frac{a+b}{2}\right)dx$ , 可知

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2} \left( \frac{43}{255}f(a) + \frac{15}{255}f\left(\frac{5a+3b}{8}\right) - \frac{44}{15}f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{15}{255}f\left(\frac{3a+5b}{8}\right) + \frac{43}{255}f(b) \right)$$

4. (a) 由前两个条件可假设  $p_3(x) = (s + tx)x^2$ , 而代入可得  $\begin{cases} (s + ta)a^2 = a^5 \\ 2as + 3a^2t = 5a^4 \end{cases}$ , 当  $a \neq 0$  时解得

$$p_3(x) = -2a^3x^2 + 3a^2x^3$$

(b)

$$f(x) - p_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi_x)}{24}x^2(x-a)^2$$

由于  $f^{(4)}(\xi_x) = 120\xi_x$ , 代入可得

$$\xi_x = \frac{24(x^5 + 2a^3x^2 - 3a^2x^3)}{120x^2(x-a)^2} = \frac{1}{5}(x+2a)$$

5. 取  $\ln$  可得线性规划问题  $bx + \ln a \mathbf{1} \sim \ln y$ , 其中  $\mathbf{1}$  代表各分量全为 1 的向量, 于是作最小二乘估计可得

$$\begin{cases} \frac{2\ln a}{a}(bx + \ln a \mathbf{1} - \ln y)^T \mathbf{1} = 0 \\ 2(bx + \ln a \mathbf{1} - \ln y)^T x = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} b = \frac{\overline{x \ln y} - \bar{x}\bar{\ln y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} \\ a = \exp(\bar{\ln y} - b\bar{x}) \end{cases}$$

此处上划线代表五项求和后取平均。代入可得

$$\begin{cases} a = \frac{6075}{112}e^{1/10} \approx 1.49 \\ b = \frac{1}{10} \ln \frac{112}{3} \approx 0.36 \end{cases}$$

6. 记  $X = (1, x, x^2)$ ,  $Y = y - x^3$ , 则问题变为最小的  $w = (c, b, a)^T$  使得  $\|Xw - Y\|^2$  最小, 求梯度可得  
需 (计算验证可知  $X^T X$  可逆)

$$X^T X w = X^T Y \Rightarrow w = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

于是计算得

$$\begin{cases} a = -\frac{757}{56} \\ b = \frac{8741}{168} \\ c = -\frac{2803}{56} \end{cases}$$